


Boletim de Vigilância Epidemiológica
Edição nº 01 agosto-2017
Alto Rio Doce-MG




É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças.

CONTROLE DE VETORES

Engloba uma série de metodologias para limitar ou eliminar insetos ou outros artrópodes que transmitem patógenos causadores de doenças. O controle vetorial pode ser dividido principalmente em controle biológico, mecânico ou ambiental e químico.



ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS



ELIMINAÇÃO DE FOCOS DO MOSQUITO

Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água. Coloque o lixo em sacos plásticos. Não jogue lixo em terrenos baldios. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha-as sempre com a boca para baixo. Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje e calhas entupidas. Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda. Se for guardar pneus velhos em casa, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva. Piscinas e fontes decorativas devem ser sempre limpas e cloradas. Sempre que possível evite o cultivo de plantas como bromélias ou outras que acumulem água em suas partes externas.



LEVANTAMENTO DE INDICE – LI

O objetivo do levantamento é identificar as áreas da cidade com mais proporção/ocorrência de focos do mosquito e os criadouros predominantes. Essas informações possibilitam a intensificação das ações de combate à dengue nos locais com maior presença do mosquito *Aedes aegypti*.

PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE - PCE

A rotina do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose baseia-se em realizar na população exames coproscópicos, tratamentos dos casos positivos nas Unidades de Saúde municipais, bem como mobilização da população para o conhecimento e prevenção da doença. Ressalta-se a importância da identificação dos locais onde há a presença dos caramujos, para que se tornem possíveis a promoção de ações voltadas para a melhoria sanitária e saneamento ambiental nessas áreas.



Os sintomas mais comuns da esquistossomose são dores abdominais, náuseas e sensação de estômago cheio, o que provoca perda de apetite e emagrecimento, prisão de ventre ou diarreia e tosse seca.

COLETA DE ÁGUA



CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA

No mês de maio, a vigilância epidemiológica realizou a campanha Anti-Rábica Animal. Foram vacinados na Zona Rural 2.831 cães e 646 gatos. E na zona urbana 1.182 cães e 269 gatos. Sendo a meta de 2017 ultrapassada no valor de 4.928 animais vacinados.

